

Памятка по проведению вакцинации.

Приказ МЗ РФ № 1112Н от 06.12.2021 «Об утверждении национального календаря прививок по эпидемиологическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»

Прививка	Подлежащий контингент и сроки проведения
Вакцинация против дифтерии столбняка (АДС-М)	Все взрослое население каждые 10 лет (ревакцинация). При отсутствии документальных данных о прививках и пропуске интервала ревакцинации, вакцинация проводится заново по схеме 0-1, затем ревакцинация через 6 месяцев. Далее ревакцинация каждые 10 лет.
Вакцинация против кори	Взрослые до 35 лет, двукратная вакцинация (интервал должен быть не менее 3 месяцев от первой). Взрослые до 55 лет, двукратная вакцинация по профессиональным группам риска, а именно медицинские работники, работники сферы торговли, сферы обслуживания, работники дошкольных и школьных образовательных учреждений, вахтовики, работники работающие на КПП на границе. При наличии сведений об однократной вакцинации против кори, проводится вторая вакцинация (важно чтобы прошло не менее 3 месяцев от первой)
Вакцинация против краснухи	Девушки до 25 лет вакцинируются двукратно (не привитые и не болевшие краснухой в детстве) При наличии в анамнезе одной прививки, проводится вторая (интервал не менее 3 месяцев)
Вакцинация против гепатита В	Все взрослые трехкратно до 55 лет по схеме 0-1-6 (1 доза в момент начала вакцинации, вторая через месяц после первой, третья через 6 месяцев от первой)
Вакцинация против гриппа	Все взрослые ежегодно без ограничения возраста, в первую очередь лица старше 60 лет, лица имеющие хронические заболевания со стороны дыхательной системы, ССЗ, сахарный диабет, болезни обмена веществ, медицинские работники, работники образовательных учреждений, работники торговли и сферы обслуживания, студенты.
Национальный календарь по эпидемиологическим показаниям	
Вакцинация против пневмококковых инфекций	Лица старше трудоспособного возраста (мужчины старше 60 лет, а женщины старше 55 лет) имеющие в анамнезе такие хронические заболевания: дыхательной системы, ССЗ, болезни обмена веществ, сахарный диабет, лица призывного возраста. Рекомендуется начинать вакцинацию от пневмококковой инфекции с вакцины Пневмоар 13, затем не ранее чем через 8 недель Пневмовакс 23. Ревакцинация не требуется. Допускается повторное введение вакцины Пневмовакс 23 пациентам старше 65 лет, которые были приняты однократно этой вакциной в возрасте до 65 лет (интервал от первой сделанной прививки до второй не менее 5 лет)

Против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2	К приоритету 1-го уровня относятся: лица в возрасте 60 лет и старше; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям: работники медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания и многофункциональных центров; лица, проживающие в организациях социального обслуживания; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением; граждане, проживающие в городах с численностью населения 1 млн и более. К приоритету 2-го уровня относятся: взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям: работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу; лица, работающие вахтовым методом; волонтеры; военнослужащие; работники организаций сферы предоставления услуг. К приоритету 3-го уровня относятся: государственные гражданские и муниципальные служащие; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу. Дети от 12 до 17 лет (включительно) (вакцинация проводится добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей (или иного законного представителя)).
Вакцинация против гепатита В	Контактные не имеющие сведения о прививках в очагах гепатита В
Вакцинация против бешенства	Лица подверженные профессиональному риску заражения: егеря, лесники, врачи ветеринары, лица осуществляющие уход за животными.
Вакцинация гепатита А	Лица подверженные профессиональному риску заражения (медицинские работники, работники сферы обслуживания, работники пищевой промышленности, лица обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения).
Вакцинация против кори	Вакцинация лиц без ограничения возраста не привитых и не болевших корью в очаге.
Вакцинация против ветряной оспы	Вакцинация лиц призывного возраста, не привитые и не болевшие ветрянкой в детстве.
Вакцинация против менингококковой инфекции	Вакцинация лиц призывного возраста, не привитые и не болевшие ветрянкой в детстве.